


# НАЧНИТЕ и ПРОДОЛЖАЙТЕ

## лечение препаратом НовоМикс® 30


Инсулинотерапия должна быть нацелена на контроль ППГ\*

Увеличение уровня ППГ\* приводит к росту относительного риска смерти независимо от уровня гликемии натощак<sup>2</sup>



Данные получены в исследовании DECODE, 1999<sup>2</sup>. В исследовании был проанализирован относительный риск смерти у пациентов с диабетом 2 типа в зависимости от гликемии натощак и через 2 часа после еды. В исследование DECODE были включены 18048 мужчин и 7316 женщин, у которых оценивалась гликемия натощак и гликемия через 2 часа после стандартного глюкозотолерантного теста.

НовоМикс® 30 на 10% эффективнее уменьшает колебания гликемии после еды по сравнению с инсулином лизпро микс 25<sup>3</sup>



\*ППГ - пострadiaльная гликемия

Данные получены в исследовании Hermansen K et al, 2002<sup>3</sup>. В исследовании у трех групп пациентов (n=61) с диабетом 2 типа был проведен сравнительный анализ гликемического профиля после еды и введения инсулина НовоМикс® 30, инсулина лизпро микс 25 и двухфазного человеческого инсулина 30/70.



Представительство компании  
Ново Нордиск А/С (Дания)  
Россия, 119330 Москва, Ломоносовский пр-т, 38  
Тел: (495) 956 11 32  
факс: (495) 956 50 13  
www.novonordisk.ru  
www.novonordisk.com  
www.novomix30.com

НовоМикс® 30

(двухфазный инсулин аспарт)

Контроль гликемии после еды и в течение дня


# НАЧНИТЕ и ПРОДОЛЖАЙТЕ

## лечение препаратом НовоМикс® 30

**Инсулинотерапия должна быть нацелена на контроль ППГ\***

Гликемия натощак и ППГ\* являются важнейшими показателями гликемического контроля при диабете 2 типа, и только контроль обоих этих показателей может привести к эффективному снижению  $HbA_{1c}$ <sup>1</sup>

50% времени человек находится в постпрандиальном состоянии<sup>1</sup>



Данные получены в исследовании Monnier L, 2000.<sup>1</sup> В исследовании были проанализированы данные по ППГ\*, осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы и влиянию терапии на уровень ППГ\*.

Большинство ведущих специалистов в области эндокринологии признают важность контроля ППГ\*, что отражено в руководствах по лечению сахарного диабета

\*ППГ - постпрандиальная гликемия



**НовоМикс® 30**  
(двухфазный инсулин аспарт)  
Контроль гликемии после еды и в течение дня